# Ophionol

**Distributore:**
sera Italia s.r.l. • Via Gamberini 110
I 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 6661333
www.sera.it • info.seraitalia@sera.biz

**Produttore:**
Alpha-Biocare GmbH
Merowinger Platz 1a • D 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 3368615

42/011

**I Ophionol** • Soluzione da spruzzare sulla pelle
**Principio attivo**: 0,2 mg Doramectina in 100 ml.

**Campi di applicazione**: per il trattamento contro acari e zecche.

- Gli **acari** hanno un diametro di 0,3 – 1,0 mm. Quando sono saturi essi sono rotondi e hanno una colorazione rossastra fino a marrone-nera. Se non hanno ancora aspirato sangue appaiono di colore più chiaro e il corpo è appiattito. L'acaro che si trova più di frequente è l'*Ophionyssus natricis*, che di fatto predilige come ospiti i serpenti ma che si può trovare anche nei sauri. Anche altre specie di acari possono colpire i rettili, come p.es. *Pterygosoma* spp., *Trombicula* spp. e *Hirstiella* spp.
  Gli acari preferiscono stare in zone protette dell'epidermide, in particolare sulle parti molli delle estremità, p.es. all'attaccatura della coda, nella zona del collo e sulle palpebre.
  Spesso si trovano acari anche sotto le squame, e questo lo si riconosce bene dalle squame sollevate.
  Specialmente in terrari con un'alta densità di animali si osserva spesso un'infestazione da acari.
  Gli animali infestati dagli acari sono agitati e si sfregano contro gli ornamenti del terrario.
- Le **zecche** (Ixodida) hanno una lunghezza di 2 – 10 mm, e quando sono sature possono raggiungere una grandezza di 3 cm. I rettili possono essere infestati da diverse specie di zecche; le più frequenti sono *Amblyomma* spp., *Aponomma* spp., *Hyalomma* spp. e *Ixodes* spp.
  Le zecche si attaccano preferibilmente sotto le squame della pelle, che poi sono leggermente sollevate. Spesso si trovano anche sulle parti molli delle estremità, p.es. nelle narici, intorno agli occhi o alla cloaca. Gli animali infestati dalle zecche sono spesso apatici a causa della perdita di sangue e/o delle sostanze tossiche nella saliva delle zecche.

**Controindicazioni ed effetti collaterali**: non utilizzare in presenza e in prossimità di aracnidi (p.es. tarantole, scorpioni), insetti o millepiedi. Tartarughe, piccole lucertole e giovani camaleonti possono reagire in modo sensibile al prodotto. L'utilizzatore è pregato di segnalare al veterinario o al farmacista qualsiasi altro effetto collaterale.

**Per animali: per rettili:**

**Istruzioni per il dosaggio:** agitare prima dell'uso! In caso di infestazione di **acari** spruzzare leggermente ma uniformemente il prodotto sull'intera superficie dell'animale, oppure applicare uno strato sottile sull'animale, facendo attenzione a proteggere le narici e gli occhi. Gli acari muoiono nel giro di pochi minuti. Siccome però si può verificare una nuova infezione in un secondo tempo (acari provenienti dall'ambiente circostante oppure che si sono schiusi da uova presenti nel terrario), il trattamento va ripetuto dopo 5 giorni.
In caso di infestazione di **zecche** applicare il prodotto direttamente sulle zecche. Se le zecche si trovano sui bordi degli occhi o vicino alle narici, inumidire un cotton-fioc con l'**Ophionol** e con questo tamponare le zecche. Le zecche morte possono essere tolte delicatamente con una pinzetta 1 – 2 giorni dopo l'applicazione dell'**Ophionol**.

**Trattamento di prevenzione:** con l'introduzione di nuovi rettili sussiste il pericolo di introdurre anche acari. Per questo motivo gli animali nuovi devono essere trattati con l'**Ophionol** a scopo preventivo.

**Misure precauzionali:** conservare in luogo inaccessibile a bambini ed animali domestici. In caso di contatto con le mani sciacquare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Non inalare. Non fumare. Non spruzzare su fiamme o su superfici calde. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Non utilizzare insieme ad altri medicinali.

**Avvertenze speciali:** evitare il contatto dell'**Ophionol** con insetti vivi destinati all' alimentazione. Gli acari non stanno continuamente sui rettili, ma bensì possono trattenersi temporaneamente anche nel terrario. Si consiglia perciò di sterilizzare ornamenti, anche nuovi, scaldandoli a più di 60 °C e di sostituire il substrato di fondo o eventualmente di utilizzare il prodotto anche per trattare il terrario. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana.

**Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato!**

**Ultimo aggiornamento: luglio 2011**