Tremacestol

Distributore:
sera Italia s.r.l. • Via Gamberini 110
I 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 6661333
www.sera.it • info.seraitalia@sera.biz

Produttore:
Alpha-Biocare GmbH
Merowinger Platz 1a • D 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 3368615

42/011

I Tremacestol • Soluzione per uso orale
Principio attivo: 0,2 g Praziquantel in 100 ml.

Campi di applicazione: per il trattamento contro Trematodi e Cestodi digenei.

- **Trematodi e Cestodi digenei** sono parassiti interni frequenti nei rettili, in particolare nei serpenti.
- I **Trematodi digenei** possono infestare la cavità orale, l'intestino, i polmoni, il coledoco, i reni o il sistema dei vasi sanguigni. Le uova dei Trematodi hanno una specie di coperchietto e sono grandi ca. 15 – 80 x 30 – 170 µm. Possono essere rilevate al microscopio in uno striscio della mucosa orale o nelle feci fresche. Trematodi digenei noti appartengono ai generi *Acanthostomum*, *Vasotrema*, *Hapalotrema* e *Heronimus*. In caso di infestazione del sistema dei vasi sanguigni si possono verificare, tra l'altro, fibrosi dei polmoni, in caso di infestazione diretta dei polmoni si può restringere la trachea. Se questi parassiti infestano il coledoco, i componenti della bile possono raggiungere la circolazione sanguigna. Un'infestazione di massa del tratto intestinale può causare inappetenza, vitalità limitata e crescita ridotta.
- Una forte infestazione da **Cestodi** può causare, specialmente nei serpenti e nei sauri, danni estesi della mucosa intestinale. In particolare nelle specie carnivore i Cestodi possono essere la causa di un forte dimagrimento. Cestodi tipici appartengono alle specie *Ophiotaenia* e *Bothrium*. Le uova sono rilevabili al microscopio nelle feci fresche, hanno un diametro di 20 – 90 µm e spesso all'interno è ben riconoscibile una larva che ha sei uncini. Alcuni Cestodi producono pacchetti di uova che possono essere grandi fino a 700 µm, come p.es. i *Kapsulotaenia* nei varani.

Controindicazioni ed effetti collaterali: i pitoni reali possono reagire in modo sensibile al prodotto. L'utilizzatore è pregato di segnalare al veterinario o al farmacista qualsiasi altro effetto collaterale.

Per animali: per rettili.

Istruzioni per il dosaggio: agitare prima dell'uso! Il dosaggio dipende dal peso degli animali da trattare. Per ogni 10 g di peso corporeo vanno somministrati per via orale 0,05 ml (= 50 µl) di **Tremacestol** in un'unica soluzione. Il trattamento va ripetuto dopo 14 giorni. Per fare ciò inserite la siringa in profondità nel contagocce del flacone e girate il tutto a testa in giù. Ora aspirate lentamente con la siringa la quantità necessaria di **Tremacestol** e somministratela nella cavità orale dell'animale. Ai serpenti il prodotto può essere somministrato anche aggiungendolo sul loro cibo. In questo caso strofinate la quantità necessaria di **Tremacestol** sul pelo dell'animale (roditore) poco prima della somministrazione.

Trattamento di prevenzione: con l'introduzione di nuovi rettili sussiste il pericolo di introdurre anche i parassiti sopra citati. Per questo motivo gli animali nuovi devono essere trattati con il **Tremacestol** a scopo preventivo.

Misure precauzionali: conservare in luogo inaccessibile a bambini ed animali domestici. In caso di contatto con le mani sciacquare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Non utilizzare insieme ad altri medicinali.

Avvertenze speciali: in generale l'infezione con Trematodi o Cestodi digenei avviene per mezzo di ospiti intermedi idonei, p.es. determinate lumache, insetti o addirittura larve di anfibi. Poiché i processi di sviluppo dei parassiti sopra citati sono spesso legati ad ospiti intermedi altamente specifici, in cattività il ciclo vitale di questi parassiti è praticamente sempre interrotto, e quindi non sussiste alcun pericolo di un'infezione di altri animali nel terrario. Il trattamento deve perciò essere eseguito solo sui singoli animali ammalati. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana.

Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato!

Ultimo aggiornamento: luglio 2011