Oxyspirol

Distributore:
sera Italia s.r.l. • Via Gamberini 110
I 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 6661333
www.sera.it • info.seraitalia@sera.biz

Produttore:
Alpha-Biocare GmbH
Merowinger Platz 1a • D 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 3368615

42/011

I Oxyspirol • Soluzione per uso orale
Principio attivo: 4 mg Doramectina in 100 ml.

Campi di applicazione: per il trattamento contro Nematodi e acari dei polmoni.

- I **Nematodi**, che possono avere una lunghezza da pochi millimetri fino a parecchi centimetri, sono parassiti intestinali frequenti nei rettili. Tipici rappresentanti di questi parassiti intestinali sono gli Ossiuri, Spiruroidei, Tricuroidei e Strongiloidei.
  L'infezione dei rettili avviene sia attraverso l'ingestione di uova embrionate oppure attraverso la somministrazione di insetti infettati che servono ai parassiti come ospite intermedio. Sintomi di un'infestazione da Nematodi intestinali vanno da disturbi della digestione non specifici, che si evidenziano con feci troppo dure o troppo tenere, fino ad un eccessivo dimagrimento e conseguente letargia.
- I **Nematodi** del genere *Rhabdias* sono parassiti frequenti dei polmoni. La rilevazione dell'agente patogeno avviene attraverso una ricerca al microscopio di uova e larve nella saliva o di larve nelle feci, nelle quali in determinate circostanze è possibile confonderle con le larve dei Nematodi intestinali (*Strongyloides* spp.). Sintomi di un'infestazione dei polmoni sono rantoli o sibili respiratori, accompagnati da bolle di muco nelle narici e nella trachea. Spesso gli animali tengono la bocca aperta in posizione di riposo.
- Gli **acari dei polmoni** (Entonissidi) hanno una grandezza di soli 0,5 mm e vivono nelle vie respiratorie dei rettili, preferibilmente nei serpenti.

Controindicazioni ed effetti collaterali: non utilizzare su coccodrilli e scinchi. Tartarughe, piccoli sauri e giovani camaleonti possono reagire in modo sensibile al prodotto. L'utilizzatore è pregato di segnalare al veterinario o al farmacista qualsiasi altro effetto collaterale.

Per animali: per rettili.

Istruzioni per il dosaggio: agitare prima dell'uso! Il dosaggio dipende dal peso degli animali da trattare. Per ogni 10 g di peso corporeo vanno somministrati per via orale 0,05 ml (= 50 µl) di **Oxyspirol** in un'unica soluzione. Il trattamento va ripetuto dopo 14 giorni. Per fare ciò inserite la siringa in profondità nel contagocce del flacone e girate il tutto a testa in giù. Ora aspirate lentamente con la siringa la quantità necessaria di **Oxyspirol** e somministratela nella cavità orale dell'animale. Ai serpenti il prodotto può essere somministrato anche aggiungendolo sul loro cibo. In questo caso strofinate la quantità necessaria di **Oxyspirol** sul pelo dell'animale (roditore) poco prima della somministrazione.

Trattamento di prevenzione: con l'introduzione di nuovi rettili sussiste il pericolo di introdurre anche i parassiti sopra citati. Per questo motivo gli animali nuovi devono essere trattati con l' **Oxyspirol** a scopo preventivo.

Misure precauzionali: conservare in luogo inaccessibile a bambini ed animali domestici. In caso di contatto con le mani sciacquare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Non utilizzare insieme ad altri medicinali.

Avvertenze speciali: le uova dei Nematodi arrivano nel terrario con le feci dei rettili. È perciò importante sostituire il substrato di fondo del terrario e anche sterilizzare gli ornamenti scaldandoli a più di 60 °C. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana.

Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato!

Ultimo aggiornamento: luglio 2011