

Distributore:

Sera Italia s.r.l. • Via Gamberini 110
I 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 6661333
www.sera.it • info.seraitalia@sera.biz

Produttore:

Alpha-Biocare GmbH
Merowinger Platz 1a • D 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 3368615

I Eimerol • Sospensione per uso orale
Principio attivo: 0,4 g Diclazuril in 100 ml.

Campi di applicazione: per il trattamento contro protozoi endoparassitari (specie *Eimeria* e *Isospora*).

I **coccidi** fanno parte dei protozoi e sono microscopici parassiti unicellulari che vivono nelle cellule di diversi organi. Le specie di coccidi dei generi *Eimeria*, *Caryospora* e *Sarcocystis* sono molto ospite-specifici e colpiscono di frequente l'intestino, i dotti biliari o anche i reni dei rettili.

Di particolare importanza è l'*Isospora amphiboluri* nelle Pogona. L'infezione con le specie *Eimeria*, *Caryospora* e *Isospora* avviene attraverso l'ingestione di oocisti infettive che possono essere presenti, ad es. nell'acqua potabile. Infezioni con le specie *Sarcocystis* e *Schellackia* avvengono attraverso il consumo dei rispettivi ospiti intermedi, come p.es. tramite determinati cibi vivi.

I sintomi di un'infestazione da *Eimeria* o *Caryospora* vanno dall'inappetenza e dall'agitazione alla diarrea con occasionali perdite di sangue. La rilevazione di agenti patogeni in presenza di specie parassite intestinali avviene attraverso l'esame microscopico delle feci cercando le oocisti. Queste, allo stato maturo, contengono due (specie *Sarcocystis*) oppure quattro (specie *Eimeria*) sporocisti.

Controindicazioni ed effetti collaterali: non noti. L'utilizzatore è pregato di segnalare al veterinario o al farmacista qualsiasi effetto collaterale.

Per animali: per rettili.

Istruzioni per il dosaggio: agitare prima dell'uso! Il dosaggio dipende dal peso degli animali da trattare. Per ogni 10 g di peso corporeo vanno somministrati per via orale 0,05 ml (= 50 µl) di **Eimerol** in un'unica soluzione. Il trattamento va ripetuto dopo una settimana. Per fare ciò inserite la siringa in profondità nel contagocce del flacone e girate il tutto a testa in giù. Ora aspirate lentamente con la siringa la quantità necessaria di **Eimerol** e somministratela nella cavità orale dell'animale. Ai serpenti il prodotto può essere somministrato anche aggiungendolo sul loro cibo. In questo caso strofinare la quantità necessaria di **Eimerol** sul pelo dell'animale (roditore) poco prima della somministrazione.

Trattamento di prevenzione: con l'introduzione di nuovi rettili sussiste il pericolo di introdurre anche i parassiti sopra citati. Per questo motivo gli animali nuovi devono essere trattati con l'**Eimerol** a scopo preventivo.

Misure precauzionali: conservare in luogo inaccessibile a bambini ed animali domestici. In caso di contatto con le mani sciacquare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Non utilizzare insieme ad altri medicinali.

Avvertenze speciali: le oocisti delle specie *Eimeria*, *Caryospora* e *Isospora* arrivano nel terrario con le feci dei rettili. È perciò importante sostituire il substrato di fondo del terrario e anche sterilizzare gli ornamenti scaldandoli a più di 60 °C. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana.

Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato!

Ultimo aggiornamento: luglio 2011