

D Gebrauchsinformation

Flagamol • Pflegemittel für Reptilien gegen Amöben und Flagellaten.
Gebrauchsinformation: Vor Gebrauch schütteln! Gegen Amöben und Flagellaten sind pro 10 g Körpergewicht 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** einmalig oral zu verwenden. Die Behandlung ist nach 14 Tagen zu wiederholen. Geben Sie dazu mit der beiliegenden Spritze die entsprechende Menge **Flagamol** in die Mundhöhle des Tieres. Schlangen können das Pflegemittel auch über Futtertiere verabreicht bekommen. Dazu reiben Sie dem Futtertier (Nagetier) die benötigte Menge **Flagamol** kurz vor der Verfütterung in das Fell.

Zusammensetzung je 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Unter Verschluss und für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen. Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt aufbewahren. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden!
Nicht mit Arzneimitteln anwenden.

US Information for use

Flagamol • Treatment for reptiles against amoebae and flagellates.
Directions for use: Shake well before using! Apply 0.05 ml (= 50 µl) **Flagamol** per each 10 g (0.35 oz.) body weight once orally against amoebae and flagellates. The treatment must be repeated after 14 days. Insert the corresponding amount of **Flagamol** into the oral cavity of the animal with the included syringe to do so. The treatment can also be applied via food animals for snakes. Rub the required amount of **Flagamol** into the fur of the food animal (rodent) immediately before feeding to do so.

Composition per 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Keep under lock and key and out of reach of children and pets! Avoid contact with skin and eyes. Store at room temperature and away from light! Not to be used in conjunction with animals used for human consumption. Do not use past the expiration of the "best before" date!
Do not combine with medications.

F Information mode d'emploi

Flagamol • Traitement pour les reptiles contre les amibes et les flagellés.
Mode d'emploi : Agitez avant emploi ! Pour lutter contre les amibes et les flagellés, administrer par voie orale une fois 0,05 ml (= 50 µl) de **Flagamol** pour 10 g de poids. Renouveler le traitement après 15 jours. Versez la quantité correspondante de **Flagamol** dans la cavité buccale de l'animal à l'aide de la seringue fournie. Le traitement peut également être administré aux serpents par le biais des proies servant de nourriture. Pour cela, frottez le poil de la proie (rongeur) avec la quantité nécessaire de **Flagamol** peu avant de la donner à votre reptile.

Composition dans 100 ml : 5-nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Conserver bien fermé et tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière. Ne pas utiliser sur des animaux destinés à la consommation. Ne plus utiliser après la date limite d'utilisation !
Ne pas combiner avec d'autres produits de traitement de l'eau.
**Distributeur : sera France SAS, 25A rue de Turckheim
F 68000 Colmar • Tél. +49 2452 9126-0 • Fabriqué en Allemagne**

NL Gebruikersinformatie

Flagamol • Verzorgingsmiddel voor reptielen tegen amoeben en flagellaten.
Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik schudden! Tegen amoeben en flagellaten moet per 10 g lichaamsgewicht 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** eenmalig oraal worden toegediend. De behandeling moet na 14 dagen worden herhaald. Doe daartoe met de bijgevoegde spuit de passende hoeveelheid **Flagamol** in de mondholte van het dier. Aan slangen kan het verzorgingsmiddel ook via voederdieren worden verstrekt. Wrijf daartoe kort voor het voederen de huid van het voederdier (knaagdier) met de benodigde hoeveelheid **Flagamol** in.

Samenstelling in 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Afgesloten en ontoegankelijk voor kinderen en huisdieren bewaren. Niet in contact met huid en ogen brengen. Bewaren bij kamertemperatuur en beschermd tegen licht. Niet gebruiken bij dieren, die voor consumptie bestemd zijn. Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken!
Niet in combinatie met andere verzorgingsmiddelen gebruiken.

I Informazioni per l'uso

Flagamol • Prodotto per la cura dei rettili contro Amebe e Flagellati.
Istruzioni per l'uso: Agitare prima dell'uso! Per eliminare Amebe e Flagellati somministrare per via orale 0,05 ml (= 50 µl) di **Flagamol** per ogni 10 g di peso corporeo. Il trattamento va ripetuto dopo 14 giorni. La quantità appropriata di **Flagamol** va somministrata nella cavità orale dell'animale utilizzando la siringa inclusa nella confezione. Ai serpenti il prodotto può essere somministrato anche aggiungendolo sul loro cibo. In questo caso strofinare la quantità necessaria di **Flagamol** sul pelo dell'animale (roditore) poco prima della somministrazione.

Composizione per 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Conservare in un armadietto chiuso e lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con pelle e occhi. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato!
Non può essere usato in combinazione a prodotti curativi.
**Importato da: sera Italia s.r.l., Via Gamberini 110
40018 San Pietro in Casale (BO)**

E Información para el usuario

Flagamol • Producto de cuidado para reptiles contra amebas y flagelados.
Instrucciones de uso: ¡Agítese antes de usar! Contra amebas y flagelados se deben administrar una sola vez por vía oral 0,05 ml (= 50 µl) de **Flagamol** por cada 10 g de peso corporal. El tratamiento se debe repetir al cabo de 14 días. Para ello, administre con la jeringa incluida la cantidad correspondiente de **Flagamol** en la cavidad bucal del animal. A las serpientes también se les puede administrar el producto de cuidado a través de animales alimenticios. Para ello, unte en la piel del animal alimenticio (roedor) la cantidad necesaria de **Flagamol** poco antes de darlo de comer.

Composición en 100 ml: 5-nitro-1,3-tiazol-2-il-azano 340 mg.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños y animales de compañía. Evite el contacto con la piel y los ojos. Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz. No usar en animales destinados a la alimentación. ¡No usar después de la fecha de caducidad!
No combine este producto con medicamentos.

P Instruções para utilização

Flagamol • Tratamento para répteis contra amebas e flagelados.
Instruções para utilização: Agite bem antes de usar! Contra amebas e flagelados administre, uma só vez e por via oral, 0,05 ml (= 50 µl) de **Flagamol** por cada 10 gramas de peso do animal. O tratamento deve-se repetir após 14 dias. Para isso, utilizando a seringa incluída na embalagem, introduza a quantidade correspondente de **Flagamol** na boca do animal. As cobras também podem receber o tratamento através dos animais que elas comem. Para isso, pouco antes da alimentação, aplique a quantidade necessária de **Flagamol** sobre o alimento vivo (roedor) esfregando no pêlo.

Composição para 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Mantenha fechado à chave e fora do alcance das crianças e animais de estimação. Não deve entrar em contacto com a pele e com os olhos. Guardar à temperatura ambiente e longe da luz. Não deve ser usado em animais destinados a consumo humano. Por favor não usar após a data "Consumir de preferência antes de"!
Não combinar com medicamentos.

S Produktinformation

Flagamol • Preparat till reptiler mot amöbor och flagellater.
Bruksanvisning: Omskakas före användning! Ge en gång 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** per 10 g kroppsvikt oralt mot amöbor och flagellater. Behandlingen måste upprepas efter 14 dagar. Ge motsvarande mängd **Flagamol** i djurets mun med hjälp av den bifogade sprutan. Ormar kan få medlet även via foderdjur. Gnid den nödvändiga mängden **Flagamol** i foderdjurets (gnagarens) päls strax före utfodringen.

Sammansättning per 100 ml: 5-nitro-1,3-tiazol-2-ylazan 340 mg.
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med huden och ögonen. Förvaras vid rumstemperatur och skyddat för ljus. Efter bäst-före datumet bör preparatet ej längre användas!
Får ej användas samtidigt med preparat mot sjukdomar.

FI Käyttöohje

Flagamol • Matelijoiden hoitoaine ameboihin ja siimaeliöihin.
Käyttöohjeet: Ravista hyvin ennen käyttöä! Annostele 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** jokaista 10 g ruumiinpainoa kohden kerran suuonteloon ameboihin ja siimaeliöihin vastaan. Hoito on uusittava 14 päivän jälkeen. Aseta annosteltava määrä **Flagamol** eläimen suuonteloon mukana olevalla lääkeruiskulla. Hoitoainetta voidaan myös annostella käärmeiden ruokaeläimiin. Hiero annosteltava määrä **Flagamol** ruokaeläimen turkkiin (jyrsijä) välittömästi ennen ruokintaa.

Koostumus per 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiatzol-2-ylazan 340 mg.
Säilytettävä lukitussa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Vältä ihon ja silmien joutumista kosketukseen aineen kanssa. Säilytettävä huoneenlämmössä ja valolta suojattuna. Ei saa käyttää elintarvikkeiksi tarkoitetuille eläimille. Älä käytä tuotetta "parasta ennen" päiväyksen jälkeen!
Älä käytä yhdessä hoitoaineen kanssa.

DK Brugsinformation

Flagamol • Plejemiddel til reptiler mod amøber og flagellater.
Bruksanvisning: Omrystes før brug! Mod amøber og flagellater skal der pr. 10 g kropsvægt gives 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** én gang oralt. Behandlingen skal gentages efter 14 dage. Hertil sprøjtes den pågældende mængde **Flagamol** ind i dyrets mundhule med den medfølgende sprøjte. Slinger kan plejemidlet også gives via foderdyr. Hertil gnides den nødvendige mængde **Flagamol** ind i foderdyrets (gnaver) pels kort før fodringen.

Sammensætning pr. 100 ml: 5-nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg.
Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr. Undgå kontakt med hud og øjne. Opbevares mørkt og ved stuetemperatur. Må ikke anvendes til dyr, der bruges i fødevarer. Efter udløb af holdbarhedsdatoen må det ikke anvendes mere!
Må ikke anvendes sammen med medikamenter.

GR Γενικές Πληροφορίες

Flagamol • Θεραπεία για ερπετά, κατά των αμοιβάδων και των μαστιγοφόρων (flagellates).

Οδηγίες χρήσης: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση! Χορηγήστε μια δόση από το στόμα 0.05ml (= 50 µl) **Flagamol** για κάθε 10g σωματικού βάρους κατά των αμοιβάδων και των μαστιγοφόρων. Η θεραπεία πρέπει να επαναληφθεί μετά από 14 ημέρες. Χορηγήστε την απαιτούμενη ποσότητα του **Flagamol** μέσα στην στοματική κοιλότητα του ζώου χρησιμοποιώντας την σύριγγα που περιέχεται στην συσκευασία. Η θεραπεία μπορεί επίσης να χορηγηθεί στα φιδία και μέσω των προς βρώσιν ζωντανών. Βρέξτε την γούνα του ζώου (τρωκτικού) με την με την απαιτούμενη ποσότητα από το **Flagamol** αμέσως πριν το τσίσιμα.

SI Navodilo za uporabo

Flagamol • Sredstvo za nego plazilcev proti amebam in bičkarjem.

Uporaba: Pred uporabo pretresti! Proti amebam in bičkarjem dajte živali enkrat oralno na 10 g telesne teže 0,05 ml (= 50 µl) sredstva **Flagamol**. Postopek po 14 – tih dneh ponovite. Pri tem dajete ustrezno količino sredstva za nego **Flagamol** s priloženo brizgalko v ustno votlino plazilca. Pri kačah lahko daste sredstvo na živo hrano. Žival za hrano (glodavec) tik pred hranjenjem kače namažite po dlaki s primerno količino sredstva **Flagamol**.

H Felhasználási információ

Flagamol • Ápolószer hullók számára amőbák és flagelláták ellen. **Használati információ:** Használat előtt felrázandó! Amőbák és flagelláták ellen az állat testének minden 10 grammja után 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol-t** egyszeri alkalommal orálisan adjon be az állatnak. A kezelést 14 nap elteltével ismételje meg. A mellékelt fecskendővel adja a **Flagamol-t** az állat szájüregébe. A kigyóknak az ápolószert az eledelállatokon keresztül is be lehet adni. Ilyen esetben a szűkséges mennyiségű **Flagamol-t** kenje az eledelállat (rágcsáló) bundájába röviddel etetés előtt.

PL Informacje o zastosowaniu

Flagamol • Terapia dla gadów w przypadku ameby i wiciowca.

Instrukcja stosowania: Wstrząsnać przed użyciem! W przypadku ameby i wiciowca stosować doustnie podając jednorazowo 0,05 ml (= 50 µl) preparatu **Flagamol** na każde 10 g masy ciała. Kurację należy powtórzyć po 14 dniach. Odpowiednią ilość preparatu **Flagamol** podawać do jamy ustnej zwierzęcia przy pomocy załączonej strzykawki. Zabieg może być także stosowany przy użyciu zwierząt, które są pokarmem np. dla węży. Wymaganą ilość preparatu **Flagamol** wetrzeć w futro zwierząt stosowanych jako pokarm (gryzoni) bezpośrednio przed skarmieniem.

CZ Informační popis

Flagamol • Přípravek pro reptilie proti amébám a flagelátům (bičkovcům).

Návod k použití: Před použitím zatřepat! Proti amébám a bičkovcům aplikujte orálně jednorázově 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** na 10 g tělesné váhy. Ošetření je třeba provést po 14 dnech znovu. Použijte k tomu přiloženou stříkačku a dejte patřičné množství přípravku **Flagamol** do ústní dutiny zvířete. Hadí mohou přípravek dostat i v krmném zvířeti. Vetřete příslušné množství **Flagamol** do srsti krmného zvířete (hlodavce) krátce před krmením.

TR Kullanım bilgileri

Flagamol • Amip hastalığı ve flagelat hastalıklarına karşı sürün-genlerin tedavisi.

Kullanma talimatı: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız! Amip hastalığı ve flagelata karşı her 10 g vücut ağırlığı için bir kez ağızdan 0,05 ml (= 50 µl) **Flagamol** uygulayınız. 14 gün sonra tekrarlanmalıdır. Uygun miktarda **Flagamol**’ü hayvanın ağız boşluğuna şırınga ile uygulayınız. Tedavi yılanlar için yem hayvanlar vasıtasıyla da uygulanabilir. Gerekli miktarda **Flagamol**’ü ovarak yem hayvanın kürküne (rodent) hemen beslenme öncesinde sürünüz.

RUS Инструкция по применению

Флагамол (Flagamol)• Средство по уходу для рептилий против амёб и флагеллатов.

Указания по применению: Перед применением взболтать! Против амёб и флагеллатов давать 0,05 мл (= 50 мкл) **Флагамола** на каждые 10 г веса животного орально один раз. Повторить процедуру через 14 дней. Чтобы сделать это - вставьте прилагаемый шприц с соответствующим количеством **Флагамола** в ротовую полость животного и введите средство. Для змей можно также давать средство с живым кормом. Для этого вотрите необходимое количество **Флагамола** в шерсть животного (грызуна), предназначенного в пищу, незадолго до кормления.

C 弗拉伽摩爾

弗拉伽摩爾• 爬行動物護理劑，用於對抗阿米巴和鞭毛蟲。

使用說明：使用前請充分的搖晃均勻！對抗阿米巴和鞭毛蟲，每10克體重0.05毫升（＝ 50微升）**弗拉伽摩爾**，一次性口服。14天后重複治療。用隨附注射器將相應劑量的**弗拉伽摩爾**給入動物口腔內。在治療蛇時，也可通過飼料動物而給入護理劑。此時，在即將喂蛇之前，將相應劑量的**弗拉伽摩爾**摩擦到飼料動物（齧齒動物）的皮毛內。

J 使用説明書

フラガモール•爬虫類のアメーバと鞭毛虫に対するお手入れ用薬劑

【使用方法】使用前に容器をよく振ってください！アメーバと鞭毛虫に対しては体重 10 g あたりにつき、0.05 ml (= 50 µl)の**フラガモール** を一回、経口投与してください。このお手入れを 14 日後に繰り返してください。この場合には添付の注射器で、適切な量の**フラガモール** をペットの口腔内に入れてください。蛇についてはこの薬劑は飼用動物によっても投与することができます。この場合には餌用動物(齧歯類)に必要な量の**フラガモ**

ROK 사용설 명서

플라가몰 • 파충류를 아메바 및 편모충으로부터 보호해주는 약제.

사용안내서: 사용전 흔들어 주세요! 아메바 및 편모충 제거를 위해 체중 10 g당 0.05 ml (= 50 µl)의 플라가몰을 1회 구강투여 한다. 14일 후 처리를 반복해준다. 이때 적당한 주사기를 사용, 해당량의 플라가몰을 동물의 구강에 넣어준다. 뱀에게 약제를 투여할 때는 사료용 동물을 통해서도 가능하다. 즉, 사료용 동물 (설치류)

قصير بحك الكمية المطلوبة من فلاجامول على جلد الحيوان العلفي (القوارض). المكونات في كل ١٠٠ مليلتر: ٥ سينتو-٣ ر١ غليازول-٢ غيلازات ٣٤٠ ملجم. إحتفظها مغلقة بإحكام ولا تتركها في متناول أيدي الأطفال وفي متناول الحيوانات المنزلية الأليفة. يجب تجنب تلامس هذه المادة بالجلد و العينين. يجب حفظها تحت درجة حرارة المكان، ويجب حفظها من الضوء. لاتعطيها لتلك الحيوانات التي تصلح للحصول على المواد الغذائية إن. لاتستعمله بعد إنتضاء تاريخ صلاحيتها! لاتستعملها مع أدوية أخرى.

Σύνθεση ανά 100ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazane 340mg. Αποθηκεύστε το σε κλειδωμένο βουλατίτι μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Μην αφήσετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας. Φυλάξτε το σκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου και αποφύγετε την απευθείας έκθεση του σε ηλιακό φως. Μην το χρησιμοποιείτε για ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης! Μην συνδυάζετε την θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα.

SI Sestava

Sestava v 100 ml: 5-nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg. Hranite dobro zaprto in izven dosega otrok in domačih živali. Pripravek ne sme priti v stik s kožo ali z očmi. Shranite pri sobni temperaturi in zaščitite pred svetlobo. Ne uporabljati pri živalih, ki so namenjene za prehrano. Po preteku roka trajanja ne uporabljajte več! Ne uporabljajte hkrati z zdravilnimi sredstvi. **Distributor: Vítakraft Hobby Program d.o.o., Mariborska c. 23 2327 Rače, Slovenija Ained d.o.o., Socka 30, 3203 Nova Cerkev, Slovenija**

Összetétel

100 ml-ben: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg. **Lezárva és gyerekektől és háziállatoktól elzárva tárolni. Ne érintkezzen a bőrrrel ill. Szobahőmérsékleten és fénytől védett helyen tárolni. Ne használja élelmezési célokra tartott állatoknál.** A lejárát dátuma után ne használja! Gyógyszerrel együtt ne használja. **Forgalmazó: sera Akvarisztika Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 75.**

PL Skład

Skład w 100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg. Trzymać w zamknięciu pod kluczem z dala od dzieci i zwierząt. **Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od światła. Nie może być stosowany dla zwierząt przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi.** Nie może być używany po upływie daty ważności! Nie łączyć z lekarami. Wyłącznie dla zwierząt!

Složení

Složení na 100 ml: 5-nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340 mg. **Skladovat pod zámekm a chránit před dětmi a domácími zvířaty. Přípravek se nesmí dostat do kontaktu s kůží ani s očima. Skladovat v temnu při pokojové teplotě. Nepoužívejte u zvířat určených ke konzumaci. Nepoužívat po uplynutí lhůty trvanlivosti!** Nepoužívat v kombinaci s léčivýy. **Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora**

Bileşimi

Bileşimi/100 ml: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazane 340 mg. Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde ve kilitli olarak saklayın. Gözlerle ve ciltle temasından kaçının. Oda sıcaklığında ve karanlıkta muhafaza ediniz. Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılmaz. Son kullanma tarihinden sonra kullanılmaz! İlaçlarla birlikte kullanmayın.

Состав

Состав на 100 мл: 5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazane 340 мг. Хранить закрытым, в недоступном для детей и домашних животных месте. Избегайте контакта с кожей и глазами. Хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте. Не применять для воды в случае ее возможного использования животными, предназначенными для употребления человеком в пищу. Не использовать после истечения срока годности! Недопустимо применение вместе с лекарственными средствами.

每100毫升所含成分

每100毫升所含成分：5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan 340毫克。請放置在上鎖的且幼童和寵物觸碰不到的地點。請避免與皮膚和眼睛接觸。請存放在室溫環境下並且避開光照。請勿將此產品用於人類食用的動物身上。請勿在使用期限過後繼續使用本產品！請勿和藥物混合使用。

J ールを餌付する

ールを餌付する少し前に毛皮に擦りつけてください。100 mlあたりの成分: 5-ニトロ-1.3-チアゾール-2-イラザン 340 mg。お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。皮膚に触れたり、目に入らないようご注意ください。直射日光の当たらない室温で保管してください。食用動物には使用しないでください。治療薬と併用しないでください。

을 먹이로 주기 직전

을 먹이로 주기 직전 해당량의 플라가몰을 표피에 문질러 준다. 100 ml 당 구성성분: 5-나이트로-1,3-티아졸-2-일라잔 340 mg. 쉽게 얼지 못하게 하고 어린이와 동물의 접근이 어려운 안전한 곳에 보관하십시오. 피부와 눈에 닿지 않도록 하십시오. 실내용 도에서 어두운 장소에 보관하십시오! 식료품 생산 관련 동물에는 사용하지 마십시오. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오! 의약품과 함께 사용하지 마십시오.

SA تعليمات الإستعمال

فلاجامول (Flagamol) • مادة عناية للزواحف ضد الممتورات والمسوطات.
تعليمات الإستعمال: يجب رجها قبل الإستعمال! ضد الممتورات والمسوطات يجب إعطاء ٠.٥ ر٠ مليلتر (=٥٠ ميكرولتر) من فلاجامول عبر الفم مرة واحدة وهذا عن كل ١٠ غرام من وزن الجسم. يجب تكرار العلاج بعد ١٤ يوما. قم لهذا الغرض بإعطاء الكمية المناسبة من فلاجامول في فم الحيوان بواسطة الحقنة المرفقة. يمكن تقديم مادة العناية للأفاعي أيضا عبر الحيوانات العلفية. قم لهذا الغرض قبل تقديم العلف بوقت